

VERVANGENDE LIJMPLANKEN

Speciaal samengestelde lijm, ontworpen om vrouwelijke muggen te vangen tijdens de broedcyclus. Bewezen succesvol getest door "Centers for Disease Control and Prevention". Het CDC gebruikt de Catchmaster AGO® Muggenval vervangende lijmplanken in tal van programma's voor het monitoren van muggen en populatievermindering.

KENMERKEN

- Maximaal lijmmoppervlak
- Getest, beproefde lijm
- Pesticidevrij
- UV-bestendige lijmsamenstelling
- Vochtbestendige ondergrond
- Zuinig

Item
#32AGO
Verpakt
192 vervangers per box (48 vervangers per doos)
Afmetingen val
20.25 x 6.1.875" / 51 x 16 cm



Vervangend lijmbord ontworpen voor AGO-vallen



Lijm ontworpen om muggen te vangen

AGO MUGGENVAL

Een bewakingsinstrument dat is ontworpen om vrouwelijke muggen te vangen tijdens de broedcyclus

Item	Item
#OVI-2	#32AGO
Verpakking	Verpakking
2 vallen per doos	192 lijmpl. (48 count inner boxes)
Afm. val	Afm. plaatl
12.5x17.25" / 32x44cm	20,25x6,1875 / 51x16cm

OVI-CATCH™

NIET-GIFTIG

Milieuvriendelijk | Bevat geen pesticiden

ECONOMISCH

Lagere arbeids- en materiaalkosten
Geen batterijen of elektriciteit nodig

EFFECTIEF

Dé oplossing voor geïntegreerd muggenbeheer
Vangt en doodt volwassen muggen, vooral *Aedes aegypti*

Voorkomt het uitkomen van maximaal 150 eieren per vrouwtje

MAKKELIJK IN GEBRUIK

Robuust en duurzaam gegoten ontwerp
Eenvoudig te monteren en te onderhouden.





#32 AGO- VERVANGENDE LIJMPLANK

Maximaal lijmmoppervlak | Getest, speciaal samengestelde lijm voor muggentoepassingen | Milieuvriendelijk, niet giftig | Pesticidevrije economische vochtbestendige platen | Gemaakt in de VS



Meer info: www.budgetongediertebestrijden.nl
of neem contact op met: +31 6 26 26 95 45






INSTRUCTIES

1. Vul de emmer met 9 liter kraanwater, tot net onder de afvoersleuf (fig. a)
2. Voeg een handvol organisch materiaal toe aan het water, bij voorkeur hooi!
3. Plaats de deksel op de emmer (fig. a)
4. Plaats het scherm/filter op de bodem van de opvangbak (fig. b)
5. Plaats de lijmplaat in de wand van de opvangbak, de plakkerige kant is gericht naar de binnenkant!
6. Plaats de deksel op de opvangbak (fig. b)
7. Plaats de opvangbak met het schroefdeksel erop, door in het deksel te klikken (fig. c)
8. Plaats de muggenval in uw tuin op een koele, schaduwrijke, vochtige en windstille plek, en probeer hem in een (kleur)contrasterende omgeving te plaatsen zodat hij goed opvalt. (fig. d)


Meer info: www.budgetongediertebestrijden.nl of +31 6 26 26 95 45




De gele koorts mug, *Aedes aegypti*: Hoe hij leeft en waarom hij zo moeilijk te bestrijden is.

De wetenschappelijke naam van de primaire mug die het Zika-virus verspreidt, is Aedes Aegypti. De algemene naam is de Gele Koort Mug, of GKM. Hij is uniek en moeilijk te bestrijden om de volgende redenen:

- 1** Elke mug heeft water nodig om zijn levenscyclus te voltooien. De GKMug kweekt bij voorkeur in alles wat redelijk schoon water kan bevatten, zoals banden, vogelbaden, weggegooid afval, drainageschotels voor planten, verstopte dakgoten, zeilen, enz.
- 2** Er is slechts een kleine hoeveelheid water nodig - zelfs een dop van een fles kan meer dan 100 muggen produceren. Meerdere plekken in één gebied zullen worden besmet. De levenscyclus van deze muggensoort kan in slechts 5-7 dagen worden voltooid.
- 3** De GKMug lijmt haar eieren afzonderlijk langs de waterlijn van het bakje, potje, schaalpje, dekseltje, etc.. Als haar eieren onder water staan, komen ze uit. Als ze niet onder water staan, kunnen ze een jaar of langer levensvatbaar blijven, zelfs als het bakje, potje, schaalpje, etc. droog is en geen water meer bevat.
- 4** Alleen de vrouwelijke GKMug bijt, omdat ze een eiwit nodig heeft dat in het bloed wordt gevonden om haar eieren te produceren. Na één beet kan het vrouwtje 125-150 eieren produceren. De meeste soorten muggen bijten geen mensen, maar de GKMug bijt 95% van zijn tijd mensen.
- 5** Volwassen GKMuggen vliegen slechts ongeveer 150 meter van de broedplaats. Dus als een volwassen mug in een val zit, geeft dit aan dat er in de buurt muggen broeden.
- 6** De meeste soorten muggen voeden zich in de schemering en 's avonds. De GKM eet meestal overdag, maar eet ook 's avonds.
- 7** De volwassen GKMug leeft en broedt vaak binnenshuis, dicht in de buurt van mensen. Ze hebben de neiging om mensen vanaf de knieën naar beneden te bijten, laten zich gemakkelijk onderbreken tijdens het voeren en worden vaak niet eens opgemerkt.
- 8** De GKMug is zeer goed bestand tegen bijna alle pesticiden die we tegenwoordig gebruiken, dus andere methoden, zoals het vangen en verwijderen van hun broedplaatsen, zijn noodzakelijk voor de bestrijding.



Aedes aegypti



Culex Pipiens


***Aedes aegypti* + OVI-CATCH™**

De gele koorts mug

AGO muggenval



1 Het vrouwtje heeft bloed nodig voor eierproductie




- Alleen vrouwtjesmuggen bijten
- Eiwit in bloed nodig om eieren te produceren
- Bijt bij voorkeur overdag, maar bijt ook in de avond
- Heeft de neiging om vanaf de knieën naar beneden te bijten - niet voor de hand liggend

2 De mug zoekt naar ideale omgeving voor het leggen van eieren



- Eitjes ontwikkelen zich in ongeveer 4 dagen
- Eén bloedmaaltijd levert +/- 125-140 eieren op
- Vrouwtjes zoeken koel, schaduwrijk, vochtig en windvrij plekje.
- Geeft de voorkeur aan losse containers - banden, blikjes, kinderspeelgoed, enz.

3 AGO Trap | GEEN PESTICIDEN



- De vrouwelijke mug wordt aangetrokken door de val door het uiterlijk en de geur van hooi-infusie (d.)
- De mug komt de val binnen via het deksel van de opvangkamer a.) en komt vast te zitten op het plakbord (b.)
- Het vrouwtje kan het water niet meer bereiken, want ze kan niet door het scherm heen (c.)

4 De mug zit in de val



- De mug zit in de val en sterft nadat zij op het plakbord is geplakt
- De meeste eieren zullen niet meer uitkomen., (